


**Horarios de lavado/
heparinización del catéter puerto
cuando tenga más de 1 mes que
no esté en uso:**

Por la mañana de 7:30 A 8:30 AM
sólo los VIERNES

Por la tarde de 1:30 A 2:30 PM
sólo los MARTES

NOTA:


En caso de no usar el catéter puerto en un periodo mayor a 30 días acudir a heparinización, solicitar una cita en admisión continua o Clínica de Accesos Vasculares.



¿Tienes alguna duda?



¡Te dejamos nuestro contacto!



HRAEB

Bld. Milenio #130 Col. San Carlos la Roncha, 37660
León, Guanajuato.
www.hraeb.salud.gob.mx

Teléfono: 2-67-2000
Extensión: 1809
Clínica de catéteres



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



CLINICA AL CUIDADO DE LOS
ACCESOS VASCULARES
HRAEB

Manejo Integral del Catéter Puerto

CATETER TOTALMENTE
IMPLANTADO (PUERTO)



**¡ Si cuido mi PUERTO
cuido mis venas !**

Qué es un catéter puerto?


Es un catéter de silicón o poliuretano que es altamente aceptado por el cuerpo, el cual se coloca por debajo de la piel; este puede ser de una o dos cámaras.



Por qué elegir un catéter puerto en los tratamientos a largo plazo?


- Reducir el número de punciones a pacientes que requieran tratamientos prolongados.
- Evitar los daños por en la piel producidos por medicamentos.
- Disminuir el dolor y la ansiedad del paciente.
- Favorecer la comodidad del paciente.

La instalación de este tipo de catéteres se debe realizar en un quirófano



Además está indicado para:

Administración de medicamentos vesicantes e irritantes en enfermedades Oncológicas y Hematológicas.



Administración de Sangre (casos especiales) y Administración de Medicamentos específicos



Cuidados de mi catéter puerto

- Lave siempre sus Manos antes de tocar el área de su catéter.
- Se debe realizar curación de la herida al día siguiente de que se instala el catéter puerto.

- Después se realiza curación durante el baño hasta que haya cicatrizado la herida quirúrgica.
- En caso de dolor, enrojecimiento, si se abre la herida de su puerto o tiene alguna secreción acuda a Admisión Continua.
- La primera colocación de aguja se recomienda que sea a los dos o tres días posteriores a la instalación, esto debido a la inflamación por la cirugía.
- La colocación de aguja y el retiro de este lo realiza el personal de clínica de accesos vasculares o quimioterapia ambulatoria.
- En caso de usar crema EMLA, aplíquela al menos 30 min. Antes de la punción.
- Una vez instalada la Aguja se realiza el cambio cada 5 días.
- Todos los medicamentos administrados por el catéter puerto deben

